



**Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor
PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.**

Beste IKB-varkenshouder.

Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds de vorige versie van deze lijst. De UDD-
maatregel is nog steeds van kracht.

U zult enkel producten 1^e keuze en voor individuele behandeling op de lijst zien.

Daarnaast is onze vaccinlijst ge-update.

Uw dierenartsen.

POSITIEVE LIJST IKB VARKEN DIERENKLINIEK DE KEMPEN
Versie 03032015.

In beginsel mogen de diergeneesmiddelen voor individuele behandeling op de lijst onder de voorwaarden van de UDD regeling gebruikt worden voor zeugen, biggen en vleesvarkens. Er gelden echter uitzonderingen, deze worden dan vermeld.

Groep (keuze)	Product	RegNL	Wachttijd (dagen)
Chloortetracycline (1e)	CTC-spray	9013	0
Florfenicol (1e)	Colfen	108625	28
Oxytetracycline (1e)	Cyclosol LA	10105	30
	Engemycine 10 %	8291	18
	Engemycine Spray	102670	0
	Oxymax 100 mg/ml	112077	24
Penicilline (1e)	Depocilline	4259	10
TrimSulfa (1e)	Dofatrim	8762	42
	biggen < 25 kg of < 10 wkn leeftijd en zeugen (alleen vermeerdering)		
Tylosine (1e)	Tylan 200 injectie	10100	30
Overige producten			
(1e)	Lincomycine-Spectinomycine pro inj	8271	42

Praktijkformularium Dierenkliniek De Kempen versie 03032015

Aandoening	Product
per injectie	
Maagdarmproblemen	
- Geboortediarrée:	
verwekker E. Coli	Dofatrim
verwekker Clostridium	Oxymax
- Speendiarree (E.Coli)	Dofatrim
- Salmonella	Oxymax

Ademhalingsaandoeningen	
- Mycoplasma	Tylan injectie Oxymax
- Eenzijdige longontsteking (APP)	Engemycine 10 % Oxymax Colfen

Overige aandoeningen	
- Hersenvliesontsteking	Depocilline
- Gewrichtsontsteking	Depocilline
- Smeerwrag	Depocilline
- Polyserositis (Glässer)	Oxymax
Uieronsteking	Dofatrim

Opmerkingen:

Dit praktijkformulier hoort bij versie 03032015 van de positieve lijst IKB varken Dierenkliniek de Kempen. U kunt dit lijstje bij uw diergeneesmiddelen bewaren.

- Dofatrim, alleen voor big en/of zeug.
- behandel de dieren volgens de bijsluiters.
- ernstig zieke dieren eten niet (meer) en de wateropname is dikwijls matig, deze dieren inspuiten.
- wanneer het gebruikte middel onvoldoende resultaat geeft of als u koppelmedicatie noodzakelijk acht, schakel dan uw dierenarts in.
- uw begeleidend dierenarts maakt in overleg met u een bedrijfsformulier.
- op verzoek zijn bijsluiters beschikbaar.

De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op indicatie volgens de bijsluiter en het Formularium Varken van de KNMvD (versie 15 november 2012). Voor de onderstreepte producten komt de indicatie niet overeen, maar de WVAB heeft wel aangegeven dat dezelfde werkzame stof beschikt is als 1^e keus bij de betreffende indicatie. Dit zijn dan de zogenaamde “knelpunten”. Deze gevallen zijn goed onderbouwd door Dierenkliniek De Kempen bij de betreffende instantie(s) reeds neergelegd.

UDD maatregel

Per 01032014 treedt de zogenaamde UDD (= Uitsluitend Door de Dierenarts) maatregel in werking. Dat betekent dat enkel de dierenarts antibiotica mag toedienen. Dit tenzij...

Er zijn uitzonderingen mogelijk onder voorwaarden:

1. er moet een een-op-een-overeenkomst zijn met de dierenarts.
2. Op verzoek van de varkenshouder bezoekt de dierenarts het bedrijf tenminste 1x per maand en doet hiervan verslag (algemene gezondheidstoestand van de dieren en evaluatie vastlegging antibioticum inzet).
3. bedrijfsdossier is aanwezig op het bedrijf en bevat minstens het BGP (bedrijfsgezondheidsplan) en een BBP (bedrijfsbehandelplan).

De dierenarts geeft alleen antibiotica af voor dieren die klinisch geïnspecteerd zijn door hem/haar en waarvoor een diagnose is gesteld.

De hoeveelheid af te geven antibiotica is zoveel als nodig is om één behandeling af te maken (dus voor één kuur). Hier zal gewerkt worden met een zo kleinst mogelijke verpakking.

Dierenarts en varkenshouder maken afspraken over de opvolging van de te behandelen dieren en leggen dit vast in het bedrijfsdossier.

Uitzonderingssituatie(s):

1. dierenarts mag antibiotica afgeven die de varkenshouder wel zelf mag toedienen, maar alleen wanneer het aandoeningen betreft die beschreven zijn in het bedrijfsdossier, het BBP en waarbij:
 - a. 1^e keuze middelen voor het behandelen van individuele dieren worden ingezet en op bedrijf mogen niet meer antibiotica aanwezig zijn dan voor maximaal 15 % van de aanwezige dieren in die vatbare leeftijdsgroep.
 - b. 2^e keuze middelen worden ingezet indien deze bedoeld zijn voor de behandeling van neonatale diarree of speendiarree door E. Coli, of hersenvliesontsteking door Streptococcus Suis. Dit onder aanvullende voorwaarden:
 - i. Dierenarts heeft in de afgelopen 14 dagen het varkensbedrijf bezocht en behandeling voorgeschreven (m.a.w. de middelen mogen niet langer dan 14 dagen na het bezoek aanwezig zijn op het varkensbedrijf !).
 - ii. Dierenarts heeft schriftelijke instructie achtergelaten voor het gebruik van het middel en eenduidig de te behandelen groep dieren omschreven.
 - iii. In het BGP zijn maatregelen opgenomen ter preventie van de aandoening.
 - iv. Hoeveelheid antibiotica levering mag niet meer zijn dan nodig is voor één behandeling van de door de dierenarts aangewezen dieren.

Deze 2^e keuze inzet geldt tot 1 maart 2016. Daarna mogen geen 2^e keuze antibiotica meer worden ingezet !!

Concreet: varkensbedrijf met regelmatige inzet van colistine (ivm E.Coli) of amoxicilline (ivm Streptococci) zal per 1 maart 2014 elke 14 dagen een bedrijfsbezoek moeten ondergaan.

**Vaccins in gebruik op IKB varkensbedrijven van Dierenkliniek De Kempen
versie 03032015.**

Vaccin	Indicatie	Dosis (ml)	Voorschrift	IKB wachttijd
Porcilis Ery	vlekziekte enting	2	Opfok: 3e, 4e mnd Zeugen: lactatie Fokberen: 2 x per jaar	0 dagen
Porcilis Ery + Parvo	vlekziekte + parvo enting	2	Opfok: minimaal 6.5 mnd Zeugen: lactatie	0 dagen
Porcilis Porcoli	coli enting zeug	2	1e dracht: 8 en 2 wkn voor geboorte Volgende dracht: 2 wkn voor geboorte	0 dagen
Porcilis ColiClos	Clostridium + Coli enting zeug	2	1e dracht: 6 + 2 wkn voor werpdatum. Volgende dracht: 2 wkn voor de werpdatum.	0 dagen
Ecoporc Shiga	Slinger enting big	1	Biggen, vanaf 4 dagen leeftijd	0 dagen
Porcilis Glässer	Glässer enting	2	Vanaf 5 wkn lftd 2x met interval van 2 weken. Zeugen: 2x per jaar (niet in laatste maand dracht)	0 dagen
Porcilis Parvo	parvo enting	2	Opfok: minimaal 6.5 mnd Zeugen: lactatie	0 dagen
Porcilis AR-T DF	snuffel enting	2	Zeugen: dracht 2x met interval van 6 weken, waarvan de laatste 6-2 wkn voor geboorte. Volgende dracht: 6-2 wkn voor de geboorte	0 dagen
Porcilis APP	Actinobacillus enting	2	Biggen: 6 en 10 wkn Vleesvarkens: 10 en 14 wkn	0 dagen
Porcilis PRRS	abortus blauw enting (eu stam)	2	Biggen: 6-10 weken Zeugen: 3x per jaar, of D6/60	0 dagen

Unistrain PRRS	Abortus blauw enting (europese stam)	2	Zeugen: 2 weken voor dekken, of D60 dracht. Gelten: 4 weken voor dekken	0 dagen
Gripovac 3 / Respipors Flu3	griep enting (3 stammen)	2	Biggen: basisvaccinatie: 2x met interval van 3 wkn. Vanaf 96 dagen lftd Herhaling zeugen/gelten: kan in alle stadia van de dracht en lactatie.	0 dagen
Eryseng Parvo	Vlekziekte + parvo enting	2	Opfok: minimaal 6 mnd Zeugen: lactatie	0 dagen
Ingelvac MycofLEX	Mycoplasma enting	1	Vanaf 3 weken leeftijd, 1x	0 dagen
Suvaxyn MH-one	Mycoplasma Enting	2	Biggen 1 x, vanaf 7 dgn leeftijd	0 dagen
Suvaxyn MHyo	Mycoplasma Enting	2	Biggen vanaf 7 dagen leeftijd 2 x met 2-4 wkn interval	0 dagen
Enterisol ileitis	PIA enting	2	Vanaf 3 wkn leeftijd	0 dagen
Porcilis PCV	Circo enting	2	Vanaf 3 dgn leeftijd, 1 x	0 dagen
Ingelvac CircoFLEX	Circo enting	1	Vanaf 2 weken leeftijd, 1 x	0 dagen
Suvaxyn PCV	Circo enting	2	Vanaf 3 weken leeftijd, 1 x	0 dagen
Improvac	Berengeur enting	2	Beren vanaf 8 weken leeftijd, 2 x (interval van 4 weken met de 2 ^e dosis 4-6 weken voor het slachten)	0 dagen